
European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

# La Riduzione del danno nel quadro delle politiche europee

Dagmar Hedrich
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Torino, Centro Congressi “Molinette Incontra”, 14 giugno 2018
LEA: la Riduzione del Danno è un diritto



# EMCDDA/OEDT

## Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze


Un'agenzia decentralizzata della UE di raccolta di informationi sulle droghe, con sede a Lisbona, nata nel 1993

Con una rete di Punti Focali Nazionali in 30 Paesi



## Principali prodotti:

- European Drug Report,
- Statistical Bulletin,
- European Guide on Health and Social Responses
- Guidance
- Country Drug Reports
- Best Practice Collection
- Other thematic web-based and print products



# Struttura della presentazione

1. Andamento delle politiche in tema di droghe e Riduzione del danno nella UE: un rapido viaggio indietro nel tempo

2. Che cosa è stato raggiunto? I principali interventi di RdD oggi

3. Nuove sfide nell'adattamento e diversificazione degli interventi di RdD


# Andamento delle politiche in tema di droghe e Riduzione del danno nella UE: un rapido viaggio indietro nel tempo

# Documenti di politica europea sulla droga

1990: Piano Europeo di contrasto sulle droga

1992: Piano Europeo di contrasto alla droga

Piano di Azione Europeo per il contrasto alla droga 1995-1999




Strategia dell'Unione europea in materia di droga 2000-04

2005-12

2013-20

# Fine degli anni '80 e primi anni '90 ...

Anni ‘80: epidemia di morti per overdose e la crisi  HIV/AIDS in Europa

Le sostanze sono consumate pubblicamente in diverse città europee

**Dalla metà degli anni ‘80 politici e parlamentari europei chiedono un approccio comune**

Le conferenze organizzate nelle **città** sostengono la tesi di un approccio basato sulla Riduzione del danno, che affronti entrambi i problemi di salute pubblica e sicurezza delle comunità

1990: prima Harm Reduction Conference a Liverpool


# Fine degli anni '80 e primi anni '90 ...

1985: commercializzazione del primo test per HIV
→ consapevolezza dell'epidemia tra i consumatori di sostanze per via iniettiva

1990:Piano Europeo per il contrasto alla droga
1992: Piano Europeo per il contrasto alla droga

1990 1992

**FIG. 1.1** Cumulative reported cases of HIV and AIDS, WHO European Region (52 countries)




[a] Data as of 1 October 2005, based on partial and preliminary national reports.

*Source:* Sexually transmitted infections HIV/AIDS programme, unpublished data, 2005.


# Nel corso degli anni '90…


1990:Piano Europeo per il contrasto alla droga

1992: Piano Europeo per il contrasto alla droga

Piano di Azione Europeo per il contrasto alla droga

1995-1999




Introduzione ufficiale dei programmi di distribuzione/scambio siringhe (NSP) e di trattamenti sostitutivi con metadone (OST) nella maggior parte dei Paesi UE; sale di consumo (DCRs) in alcune città


1993: Trattato sull'Unione Europea → Osservatorio europeo

1996: una potente combinazione di terapie antiretrovirali (ART) rende l'infezione da HIV una malattia cronica gestibile

# Quiz

## Quale tra questi Paesi è stato il primo a introdurre il trattamento sostitutivo con metadone?


- Olanda
- Italia
- Svezia
- Francia



# Quiz


## Quale tra questi Paesi è stato il primo a introdurre il trattamento sostitutivo con metadone?

- Olanda
- Italia
- **Svezia - 1967**
- Francia



# All inizio degli anni 2000

Normalizzazione' e aumento degli interventi RdD – OST/NSP,
… DCR in altre città
2003: Recommandazione del Consiglio-
I primi a riconoscere la Riduzione del danno come politica essenziale
a livello europeo






Strategia dell'Unione europea
in materia di droga 2000-04


*Raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e riduzione dei danni per la salute associati alla dipendenza da sostanze*

# La prima decade di questo millennio…

Consolidamento e diversificazione degli interventi di RdD

Aumento della disponibilità di OST

Come è cambiato il linguaggio… “RdD”




Strategia dell'Unione europea in materia di droga 2005-12

‘Obiettivo ultimo ridurre significativamente… il danno alla salute e sociale causato dall’uso e il commercio di droghe illecite (health damage)

# Vengono riconosciuti gli interventi efficaci

***Guida congiunta ECDC/EMCDDA (2011):***
Prevenzione e controllo delle malattie infettive tra PWID




**Sono raccomandati 7 interventi**

- Distribuzione di materiale per il consumo di sostanze
- Vaccinazioni
- Trattamento delle dipendenze
- Test
- Trattamento delle malattie infettive
- Promozione della salute
- Offerta mirata dei servizi




# Posizione comune dell'Unione Europea all'UNGASS 2016

## Strategia dell'Unione europea in materia di droga 2013-2020

### Posizione comune dell'Unione Europea all'UNGASS 2016:


**L'UE e i suoi Stati membri ritengono** che politiche di riduzione della domanda di droga efficaci, mirate, multidisciplinari e basate su prove devono includere prevenzione, diagnosi precoce e intervento, riduzione dei rischi e dei danni, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero e basate sulla continuità del servizio consegna.




Diminuire il numero di infezioni da HIV tra i tossicodipendenti

Calo del 51 %

tra il 2007 e il 2016




# Che cosa è stato raggiunto? I principali interventi  di RdD oggi

# OST - NSP


- Le evidenze dimostrano che i NSP sono efficaci nel ridurre la trasmissione di HIV

- 628.000 ricevono trattamento sostitutivo con oppioidi

Trends in the number in substitution treatment





Geographical availability of needle and syringe programmes in the European Union, Norway and Turkey



# Prevalenza di epatite C: differenze nazionali

- 2015-16 il range di prevalenza va da 12 % a 87 %
- 6/13 Paesi riportano dati nazionali con tassi superiori al 50 %
- I trattamenti senza interferone a somministrazione orale con agenti DAA (direct-acting antiviral) possono portare alla guarigione nel 95 % dei casi







# La riduzione delle morti per overdose rimane un obiettivo di salute pubblica difficile da raggiungere

- Oltre 9.000 morti per overdose nel 2016
- Morti soprattutto dovute a eroina e altri oppioidi
- Gli oppioidi sintetici sono una preoccupazione (farmaci e NPS es. derivati del fentanyl)
- Incrementare l'accesso all'antidoto naloxone è importante







# 1.3 milioni di persone in trattamento





- Il metadone è il più comune OST
- Andamenti e coperture nazionali variano

# Disponibilità di interventi specifici per ridurre le morti causate da oppioidi in 30 Paesi europei




Source: EMCDDA (2017) Health and social responses to drug problems: a European guide.

# Copertura geografica delle stanze per il consumo (DCRs) in Europa




Source: Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence. EMCDDA 2017.

# Sviluppi

Screening con test rapidi al fuori dai contesti sanitari (30 min)


2014: farmaci DAA per la cura di HCV

2015: Linee guida per HIV di WHO: “Test and treat”
Trattamento per HIV come prevenzione (TasP)

2015/16 Piano per l’eliminazione delle epatiti virali

# Tecniche e applicazioni del drug checking


FIGURE 3.8



# Nuove sfide nell’adattamento e diversificazione degli interventi di RdD


# Consumatori di oppioidi ad alto rischio: l'eroina domina ancora

- 1.3 milioni di consumatori di oppioidi
- Prevalentemente consumatori di eroina, ma anche di altri oppioidi sintetici
- Il numero di pazienti che hanno avviato un trattamento per la prima volta nella vita per problemi legati all'uso di eroina rimane sotto 30.000 dal 2011





**23** Mean age at first use


**34** Mean age at first treatment entry



# Morti per overdose: in aumento per il quarto anno consecutivo


- 9.138 morti nel 2016
- Eroina e altri oppioidi  rimangono le principlai sostanze coinvolte nei decessi
- L'aumento nei decessi si riscontra in tutte le fasce di età




# Sequestri di NPS: i catinoni sintetici e i cannabinoidi continuano a dominare

Number of seizures of new psychoactive substances reported to the EU Early Warning System: trends and distribution by category in 2016









NB: Data for EU Member States, Turkey and Norway.

# Sequestri di NPS: i catinoni sintetici e i cannabinoidi continuano a dominare

Number of seizures of new psychoactive substances reported to the EU Early Warning System: trends and distribution by category in 2016




NB: Data for EU Member States, Turkey and Norway.

# NPS: nel 2017 nove valutazioni di rischio per sostanze estremamente potenti

## 4 cannabinoidi sintetici

- NPS più frequentemente sequestrate
- Spesso sotto forma di mix di erbe per il fumo




Copyright: Jan Schäper.





Copyright: Jan Schäper.

## 5 derivati del fentanyl

- Estremamente potenti
- Sempre più abusati
- Sotto varie forme (polveri, pasticche, spray nasali)



Copyright: Anders Helander.




Copyright: Norwegian National Criminal Investigation Service (Kripos).




Copyright: Swedish Police.

# Il futuro?



# Il futuro?

Test per le malattie infettive come standard in tutti i servizi per  per il trattamento delle dipendenze e nei servizi della community  (min standard europeo)

Distribuzione di tutti gli strumenti utili all'inizione e al consumo

Test rapidi per HCV-RNA disponbili e a prezzi accessibili
Trattamenti per HCV a costi contenuti
Raccomandazioni per l'approccio "test and treat" HCV

Attenzione e consapevolezza della possibilità di overdose nel momento dell'uscita dal carcere
Distribuzione di naloxone ampiamente disponibile
Accesso al drug checking

European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

# Consultateci: emcdda.europa.eu

dagmar.hedrich@emcdda.europa.eu

**emcdda.europa.eu**

twitter.com/emcdda

facebook.com/emcdda

youtube.com/emcddatube

flickr.com/photos/emcdda